

Instrumental, materiales y procedimientos clínicos en medicina oral, periodoncia y cirugía bucal

Ficha de trabajo 1

Las afirmaciones siguientes se refieren tanto a la pulpotomía en dientes temporales como a la pulpectomía en dientes permanentes. Di cuáles son verdaderas y cuáles son falsas:

	V	F
a) En la pulpotomía se extirpa la pulpa de la raíz.		
b) Mediante la pulpectomía se extirpa solamente la pulpa de la corona.		
c) En la pulpotomía se aplica formocresol con algodón unos minutos.		
d) A veces se utiliza CIV en las pulpotomías.		
e) La conductometría es un paso importante en ambas técnicas.		
f) En ambas técnicas se debe administrar anestesia.		
g) En ambas técnicas se utilizan limas.		


Ficha de trabajo 2

Ordena los pasos que hay que seguir para realizar una pulpectomía:

- a) Anestesia locorregional
- b) Aislamiento del campo operatorio
- c) Reconstrucción de la corona
- d) Conductometría
- e) Radiografía periapical de diagnóstico
- f) Apertura de cámara
- g) Obturación de conductos
- h) Permeabilización de conductos
- i) Instrumentación o preparación de conductos

Ficha de trabajo 3

En la imagen siguiente, señala los tejidos periodontales y los tipos de placa bacteriana:



Ficha de trabajo 4

Relaciona cada afirmación con la enfermedad a la que se refiere:

- a) La mayor parte de las veces la causa el consumo de ciertos medicamentos. El acúmulo de placa y/o cálculo es un factor agravante.
- b) La actividad de algunas hormonas sexuales influye en su aparición.
- c) La destrucción del hueso puede presentar un patrón vertical.
- d) La causa fundamental es el acúmulo de placa bacteriana y cálculo.
- e) Es más frecuente a partir de los 35 años.
- f) Incide con frecuencia en pacientes jóvenes sometidos a situaciones de estrés.

- Gingivitis crónica
- Gingivitis del embarazo y de la pubertad
- Gingivitis ulceronecrotizante
- Agrandamiento gingival
- Periodontitis crónica
- Periodontitis agresiva

Ficha de trabajo 5

Relaciona cada uno de los elementos de la bandeja de periodoncia con su función:

- a) Tazas y cepillos de pulido
- b) Curetas
- c) Sonda periodontal
- d) Ultrasonido con puntas
- e) Piedra de Arkansas y piedra de India
- f) Sonda Nabers

- i) Desprendimiento del cálculo por vibración
- ii) Afilado de curetas y otros instrumentos de raspado.
- iii) Raspado y alisado radicular
- iv) Exploración de las furcas en dientes multirradiculares
- v) Pulido de la superficie del diente
- vi) Medición de parámetros periodontales

Ficha de trabajo 6

Las afirmaciones siguientes son indicaciones y recomendaciones que se hacen al paciente en el transcurso de procedimientos clínicos en periodoncia. Indica cuáles se refieren a la profilaxis supragingival y cuáles al raspado y alisado radicular. ¡Atención! Algunas de ellas se refieren a los dos procedimientos.

	Profilaxis supragingival	Raspado y alisado
a) "Lo primero que vamos a hacer es anestésiar la zona donde vamos a trabajar."		
b) "Puede ser algo molesto, pero no va a doler."		
c) "Vamos a extender una pasta en los dientes para pulirlos."		
d) "Es normal tener los dientes sensibles unos días; recomendamos una pasta dentífrica desensibilizante."		
e) "El día 23 seguimos con el segundo cuadrante, los dientes superiores de la izquierda."		
f) "Vamos a hacer un ruido molesto, pero es normal."		

Ficha de trabajo 7

Las afirmaciones siguientes se refieren a lesiones de la mucosa oral. Señala cuáles de ellas son verdaderas y cuáles son falsas.

	V	F
a) Las discromías suelen manifestarse como lesiones planas con cambios de color.		
b) La pigmentación melánica en los tejidos blandos de la cavidad bucal es una alteración peligrosa para la salud del paciente.		
c) La candidiasis pseudomembranosa o muguet se suele localizar en la mejilla.		
d) La leucoplasia es una lesión blanca más frecuente en varones de más de 40 años.		
e) La candidiasis eritematosa puede localizarse en la lengua o en el paladar.		
f) La queilitis angular suele producirse con más frecuencia en pacientes con prótesis removible.		
g) La estomatitis herpética suele ser muy dolorosa.		
h) El herpes labial se localiza principalmente en la parte central del labio.		
i) Las aftas son lesiones ulcerativas.		
j) Las lesiones exofíticas suelen localizarse con mayor frecuencia en la mucosa yugal.		
k) El cáncer oral se da con la misma frecuencia entre hombres y mujeres.		

Ficha de trabajo 8

Rellena los huecos en el texto siguiente, relacionado con la xerostomía y su tratamiento en la clínica:

La xerostomía es la sensación subjetiva de _____.
Cada vez es _____ frecuente. Todo el personal de la clínica debe participar en _____ a los pacientes sobre cómo pueden controlarla.

Si existe pérdida de la estructura _____ es más difícil su control, pero en otras ocasiones basta con tomar medidas como las siguientes:

- Realizar una ingesta mínima de _____ de líquidos al día, y evitar sustancias como el _____, el _____ o el _____.
- Actuar sobre factores psíquicos que predisponen a la sequedad de boca, como la _____.
- Reforzar los hábitos de _____, especialmente antes de dormir.
- Estimular la producción de saliva mediante el empleo de _____ sin azúcar y con xilitol.
- Empleo de _____ que buscan humedecer la mucosa bucal, y así protegerla frente a factores irritativos.
- Evitar dentífricos con _____, que es un detergente que tiende a reseca la mucosa oral.

Ficha de trabajo 9

Une cada conjunto de síntomas con la infección odontógena que los causa:

- a) Lesión circular que se observa en radiografía, consistente en una destrucción de hueso de pocos milímetros, que aloja tejido inflamatorio crónico, y no suele ocasionar síntomas.
- b) Conducto labrado en el hueso y en tejidos blandos como vía de drenaje de la infección originada en el diente, y que comunica con la piel o la boca. En su desembocadura, drena pus.
- c) Dolor agudo en diente con pulpitis previa, que se manifiesta principalmente durante la masticación o al realizar presión.
- d) Lesión que provoca que sus células se coloquen en la periferia, formando una pared, y que quede líquido en el centro. Tiende a crecer hasta producir abombamiento del hueso, hecho que suele ser uno de los primeros signos de su existencia.
- e) Se manifiesta con dolor, eritema de la piel e inflamación difusa. La infección puede extenderse a zonas anatómicas con mayor riesgo vital.

- i) Periodontitis apical
- ii) Granuloma periapical
- iii) Celulitis
- iv) Fístula
- v) Quiste radicular

Ficha de trabajo 10

Relaciona cada instrumento de la bandeja de cirugía oral con su función:

- a) Periostotomo
- b) Pinza mosquito o hemostática
- c) Portaagujas
- d) Hilo de sutura
- e) Mango y hojas de bisturí
- f) Separadores
- g) Tijeras de sutura
- h) Producto coagulante o hemostático

- i) Producir cortes o incisiones sobre los tejidos blandos.
- ii) Unir los bordes de la herida realizada tras la incisión.
- iii) Separar el hueso del colgajo junto con el periostio.
- iv) Se emplean en cirugías donde se prevé un peor control del sangrado.
- v) Sujetar la aguja de sutura.
- vi) La principal es el pinzamiento de un vaso para frenar una hemorragia.
- vii) Mantener separada la mejilla, el labio o un colgajo para favorecer la visión del cirujano.
- viii) Realizar el corte del hilo de sutura.

Ficha de trabajo 11

Identifica el siguiente instrumental de la bandeja de exodoncia:



a) _____



b) _____



c) _____



e) _____



f) _____



g) _____



d) _____



h) _____

Ficha de trabajo 12

Ordena las imágenes siguientes, que representan las fases en el proceso de exodoncia simple:



Ficha de trabajo 13

Las siguientes frases son consejos que conviene dar tras una exodoncia. Di cuales son válidos y cuáles son incorrectos.

	V	F
a) Conviene evitar el tabaco.		
b) Seguir dieta blanda durante una semana, a temperatura ambiental o algo fría.		
c) Es conveniente realizar enjuagues para ir disolviendo el coágulo.		
d) Presionar la gasa durante un mínimo de media hora.		
e) No aplicar hielo a menos que aparezcan grandes molestias y una inflamación evidente. En tal caso, aplicar hielo permanentemente.		
f) A partir del día siguiente, debe utilizar agua con sal para favorecer la cicatrización.		
g) Hasta pasados cuatro días de la exodoncia conviene no realizar el cepillado de dientes.		
h) Es importante evitar movimientos bruscos.		

Ficha de trabajo 14

Nombra las siguientes partes de un implante:

a)



b)



c)



d)

